



Ficha Técnica

Actualizado en fecha 04/2/2024

Fertilizante líquido con aminoácidos de origen vegetal de aplicación foliar.

- Abono con aminoácidos
- Producto líquido
- Apto para todo tipo de cultivos
- Aplicación foliar
- Efecto disolvente de melazas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fertilizante líquido formulado con aminoácidos de origen vegetal. Específicamente formulado para mejorar la cobertura, reparto y adherencia de todo tipo de aplicaciones foliares, especialmente indicado en cultivos de hojas cerosas.

BENEFICIOS

El producto permite una penetración y una distribución homogénea del tratamiento foliar, aplicado tanto solo como en mezcla con otros productos nutricionales o defensivos.

Su especial formulación permite al producto superar y limpiar la barrera física que se produce en la superficie de las hojas por la suciedad, la melaza y la fumagina, permitiendo que los aminoácidos de su formulación, así como cualquier producto presente en la mezcla, actúen de manera eficaz.

COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Evitar mezclas con aceites, aminoácidos, tensioactivos, cobres y azufres. KLINER MAX es compatible con la mayoría de los productos agrícolas y sustancias del mercado. Ante mezclas desconocidas, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de realizar las aplicaciones.

Temperatura de Almacenamiento de 5°C a 35°C.

Almacenar bien cerrado en lugar fresco y al abrigo de la luz solar directa en su envase original.

COMPOSICIÓN

% p/p

Aminoácidos libres Vegetales	6,0
Nitrógeno total (N)	1,0
Nitrógeno orgánico (N).	1,0

Aminograma: Lisina

Aspecto: Líquido Viscoso Marrón

pH: 9-10

Densidad: 1,07±0,3 gr/ml

Solubilidad: 100% soluble en agua

FORMATO 1 y 5 L

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto de aplicación foliar:

Para frutales: 200 a 300 ml/100 Litros de agua.

Cerca de cosecha aplicar de 200 a 250 ml/100 Litros de agua. Aplicaciones desde caída de pétalos hasta cosecha.

Para cultivos hortícolas: 150 a 300 ml/100 Litros de agua. Aplicar dosis mínima en cultivos sensibles como el pimiento.

Para cítricos: 200 a 250 ml/100 Litros de agua. En mezcla con otros productos bajar la dosis a 150-200 ml/100 Litros de agua.

Para viña: 200 a 250 ml/100 litros agua.

Para berries: 200 ml/100 litros agua. En fresón se recomienda no realizar más de dos aplicaciones sobre un mismo fruto. No es recomendable aplicar el producto en arándanos ni frambuesas.

El producto trabaja eficazmente en un rango de pH de 5 a 8.